

ويبين الجدول التالي المأخوذ من نتائج استمارة الإحصائيات مدى الاصابات التي تعرض لها الزيتون في كل منطقة .

جدول رقم (١١)

النسبة المئوية للاصابات والامراض سنة ١٩٧٠

اللواء	رام الله	نابلس	جنين	طولكرم
عدد القرى	٧٤	٤٩	٦٢	٧٧
نسبة الاصابات بحشرة الزيتون	٠/٨٤	٠/٨٨	٠/٩٢	٠/٨٤
نسبة الاصابات بحشرات أخرى	٠/٥١	٠/٩٦	٠/٨٦	٠/٧٠

وبالإضافة الى قلة الوعي، وعوامل أخرى كثيرة، فان ضعف الامكانيات المادية وانعدام التخطيط الشامل للحل يشكل سببا رئيسيا في عدم معالجة تلك الامراض والقضاء عليها .

هـ - قطف الزيتون:

يعتمد نضوج ثمر الزيتون على الموقع الجغرافي والاحوال المناخية، ونوعية الاشجار نفسها . وعندما يتحول لون (٤٠ - ٦٠ ٪) من الثمر الى اللون الاخضر الغامق (مائل الى السواد)، فانه يكون يحوي على أعلى كمية من الزيت (١).

(١) سنجر، ١٩٦٩، ص (١٦) .

وتوجد في المنطقة الانواع التالية من الزيتون التي يصدر (٧٠ - ٨٩ ٪) (١) من انتاجها الى الخارج (٢)

- ١ - الزيتون النبالي : ويحتوي على كمية من الزيت تبلغ (٢٥ - ٤٠ ٪) من الانتاج الكلي .
- ٢ - الزيتون السوري : ويحتوي على كمية من الزيت تبلغ (٣٠ - ٤٠ ٪) من الانتاج الكلي .
- ٣ - الزيتون الملبصي: ويحتوي على كمية من الزيت تبلغ (٢٠ - ٢٥ ٪) من الانتاج الكلي .

ويبدأ قطف الزيتون في المنطقة عادة، في اواخر ايلول، وينتهي في اواخر كانون اول والجدول التالي يبين المواعيد التي يسمح فيها للفلاحين، بالبدا في قطف محاصيلهم من الزيتون، حسب كل منطقة .

جدول رقم (١٢)

مواعيد ونسب كميات قطف الاشجار

النسبة المئوية لكمية الانتاج المسموح بقطفها في كل موعد				موعد القطف
رام الله	نابلس	جنين	طولكرم	
غير مسموح	٠/٢١	٠/١٣	-	٩/٣٠
٠/٧٢	٠/٢٢	٠/٥٨	٠/١٠٠	١٠/١٥
٠/٢٨	٠/٥٧	٠/٢٩	-	١٠/٣٠

(١) دائرة الزراعة بنابلس . احصائيات الزيتون، ١٩٧٠ .

(٢) الطاهر، مرجع سابق، ص (٦٥) .